


## Fiche de liaison destinée aux Parents et aux Encadrants

### Conduite à tenir en cas de Choc à la Tête d'un Enfant

Votre enfant a subi un choc à la tête c'est à dire un traumatisme crânien sans signe de gravité apparent le

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ H

Nous avons donc suivi le protocole rédigé par le CHU de Bordeaux, le SAMU-Centre 15 de la Gironde et l'ASSUM 33 (Association des Médecins Régulateurs Libéraux du SAMU – C15) en collaboration avec la DSDEN 33. 

Selon ce protocole, nous avons appelé le Centre 15 : NON :  OUI :  N° Dossier de Régulation : \_\_\_\_\_

#### Que devez-vous faire pendant 48h ?

Continuez de rassurer votre enfant, soyez à son écoute.  
Appliquez de la glace sur la bosse ou sur le point d'impact.  
Réveillez votre enfant toutes les 3 heures la 1ère nuit

Prévenez votre entourage si vous confiez votre enfant pendant cette période.

En cas de douleur, le SAMU-C15 vous recommande de donner du paracétamol à dose adaptée au poids de l'enfant et en l'absence de contre-indication.



#### Signes d'Alerte à surveiller pendant 48h :

- Somnolence inhabituelle / difficulté à se réveiller
- Changement de comportement ou d'attitude
- Vomissements répétés
- Maux de tête persistants malgré le paracétamol
- Difficultés de concentration ou à rester attentif
- Troubles de l'équilibre ou de la marche
- Écoulement de sang ou de liquide clair d'une oreille
- Perte d'audition d'une ou des deux oreilles
- Convulsions ou mouvements anormaux

#### Signes normaux fréquents :

- Fatigue, irritabilité
- Douleur sur le point d'impact ou la bosse
- Besoin d'affection / de réassurance



**Si vous repérez l'un de ces signes d'Alerte dans les 48h,  
Appelez le 15**



**Sachez que la majorité des enfants récupère bien d'un choc à la tête  
et ne garde aucune séquelle !**

 En cas d'inquiétude concernant votre enfant, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant ou à  appeler le Centre 15.